Step 1

Step 2

Luna-Wing STAIN Orange or Orange Flow

Step 3

Cervical・Internal Effect

Step. 1 プライマーを塗布後、IVO・オパークを塗布、重合します。

Step. 2 オパーク色の反映が強くなる場合等に、MO を歯頸部に使用すると自然な色調表現が行えます。

Step. 3 マメロン付近のオレンジ系の再現としてルナウイングステイン Orange または Orange Flow を塗布、築盛します。

Step 4

Step 5

※ エナメル層を築盛しながらクラックライン、ヘアラインを表現するためのステインを挟み込む。

Internal Effect/Enamel

Step. 4 切縁部に T を築盛し、老年代の切縁部に見られるオレンジ系不透明層を表現するため、T の上に Amber を築盛します。その後、歯頸部にはルナウイングステイン Red Brown、または Brown を使用して彩度補足をおこない、切縁部分にはルナウイングステイン Gray を用いてグレー系透明層を表現します。

Step. 5 歯頸部方向への飴色系透明観のグラレーション表現として CT (1 ~ 3)、または CT2 Flow を使用します。隣接方向へのエナメル色のグラレーションとして TE、LVT を使用します。

※ Step4 ~ 5 には Flow を使用すると容易に築盛することができます。